

# Aero-Sim

## Sabor a Fresa

Simeticona 80 mg / mL

ANTIPLATULENTO



**COMPOSICIÓN:** Cada mL (28 gotas) contiene:

Simeticona	80 mg
Excipientes c.s.p.	

### ▪ INFORMACIÓN CLÍNICA:

#### **INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**

Para aliviar los síntomas de flatulencia o exceso de gases;  
Para aliviar la hinchazón, presión, dolor, inflamación, sensación de llenura debido al exceso de gases.  
Para aliviar los síntomas de exceso de gases asociados con cólicos en bebés.

#### **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

##### **Adultos y Niños mayores de 12 años:**

40 a 180 mg (14 a 63 gotas) según sea necesario, después de los alimentos y antes de acostarse (3 a 4 veces al día) sin exceder la dosis máxima de 640 mg (224 gotas).

##### **Niños (2-12 años):**

Utilizar solo bajo indicación de un médico.

##### **Niños (hasta 2 años):**

Utilizar solo bajo indicación de un médico  
10 a 20 mg (4 a 7 gotas) de una suspensión oral, según sea necesario, con o después de las comidas. Hasta una dosis diaria máxima de 60 mg (21 gotas).

#### **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al principio activo (simeticona) y/o cualquiera de los componentes del producto incluidos en la "Lista de excipientes".

#### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

No usar en niños menores de 2 años excepto que haya sido indicado y bajo supervisión médica.  
No tomar por más de dos semanas, o si los síntomas persisten, a menos que sea indicado por un médico.

#### **INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:**

Suplementos de hierro: efecto disminuido. Distanciar 2 horas la toma.

#### **ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA:**

**Embarazo:** No han sido documentados problemas en humanos, se recomienda no emplearse.

**Lactancia:** se ignora si la simeticona se excreta con la leche materna, no obstante no se espera que haya excreción debido a la falta de absorción digestiva del fármaco por la madre.

#### **EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y USAR MÁQUINARIA:**

No se han reportado.

#### **REACCIONES ADVERSAS:**

Muy frecuentes: eructos y flatulencias.

**SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO:**

Los signos y síntomas de sobredosificación no están documentados, sin embargo, en caso de presentarse, el tratamiento esencialmente es sintomático y de soporte. No hay antídoto específico. El lavado gástrico en la fase temprana de la sobre dosificación es útil. Manténgase al paciente en observación, con balance apropiado de líquidos y electrolitos y una correcta ventilación respiratoria. En caso de presentarse hipotensión deben instaurarse los medicamentos convencionales para el manejo de choque circulatorio.

**PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:****PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:**

La simeticona no se absorbe y es eliminada en las heces, por tratarse de una molécula inerte, no es transformada por la flora gastrointestinal.

**DATOS FARMACÉUTICOS:****LISTA DE EXCIPIENTES:**

Benzoato de sodio, Ácido cítrico anhidro, Hidroxipropilmetilcelulosa, Goma xantan, Sacarina sódica, Citrato de sodio dihidratado, Celulosa Microcristalina y Carboximetilcelulosa sódica, Sucralosa micronizada, Esencia de fresa, Colorante rojo FDC N°3, Agua purificada.

**INCOMPATIBILIDADES:**

No se han descrito.

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL:**

No utilizar AERO-SIM 80mg/mL SABOR A FRESA SUSPENSIÓN ORAL - GOTAS después de la fecha de caducidad indicada en el envase, la cual corresponde al último día del mes señalado.

**PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:**

Mantener AERO-SIM 80mg/mL SABOR A FRESA SUSPENSIÓN ORAL - GOTAS fuera del alcance de los niños. Conservar a no más de 30 °C.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O LOS RESTOS DERIVADOS DEL MISMO:**

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto, se realizará de acuerdo con la normativa local.

**FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO DE LA FICHA TÉCNICA:**

Octubre 2019



Laboratorios Elifarma S.A.  
Av. Separadora Industrial N° 1823 - Ate, Lima - Perú  
Central: +511 4363699  
[www.elifarma.com](http://www.elifarma.com)